

Cours 2 : Surfaces paramétrées

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale


Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

Vincent Borrelli

Université de Lyon



Une surface réglée : la surface de Cayley

Définition.— Une SURFACE PARAMÉTRÉE DE \mathbb{R}^3 de classe C^k , $k \geq 1$, est une application $f : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2 \xrightarrow{C^k} \mathbb{R}^3$. L'image $S = f(\mathcal{U})$ est appelé LE SUPPORT de f .

- Toute application $g : \mathcal{V} \subset \mathbb{R}^2 \xrightarrow{C^k} \mathbb{R}^3$ telle que $g(\mathcal{V}) = S$ est appelée une C^k -PARAMÉTRISATION de S .

Définition.— Une surface paramétrée f est dite RÉGULIÈRE en $(u, v) \in \mathcal{U}$ si $f_u(u, v)$ et $f_v(u, v)$ sont linéairement indépendants, ou de façon équivalente, si la différentielle $df_{(u,v)}$ est de rang deux.

Lemme (évident).— Le point $(u, v) \in \mathcal{U}$ est régulier ssi $f_u(u, v) \wedge f_v(u, v) \neq 0$.

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge


Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

Régularité



Une cyclide de Dupin : régulier

Régularité

Surfaces
réglées


Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède



Une bouteille de Klein : régulier

Régularité

Surfaces
réglées

Gaspard
Monge


Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

Régularité



Un cône : un point singulier

Régularité

Surfaces
régliées


Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss


Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède



Une bouteille de Klein pincée : deux points singuliers

Régularité



Un cône de base une cardioïde : une arête de points singuliers

Régularité

Surfaces
régliées


Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède



Une situation plus complexe

Régularité

Définition.— Soit (u, v) un point régulier. Le plan affine passant par $p = f(u, v)$ et dont le plan vectoriel associé est $\text{Vect}(f_u(u, v), f_v(u, v))$ est appelé PLAN TANGENT de f en (u, v) . Si p n'a qu'un antécédant par f , on note

$$T_p S := p + \text{Vect}(f_u(u, v), f_v(u, v)).$$

- En un point régulier, on note

$$N(u, v) := \frac{f_u(u, v) \wedge f_v(u, v)}{|f_u(u, v) \wedge f_v(u, v)|}.$$

La droite affine $p + \text{Vect } N(u, v)$ est l'ESPACE NORMAL à S en (u, v) . Si p n'a qu'un antécédant, on note $N_p S$ l'espace normal.

- Les sous-espaces affines $T_p S$ et $N_p S$ sont invariants par reparamétrages.

Définition.— On appelle C^k -SURFACE RÉGLÉE un sous-ensemble $S \subset \mathbb{R}^3$ pour lequel il existe une paramétrisation de la forme

$$\begin{aligned} f : I \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\longmapsto \alpha(u) + v\beta(u) \end{aligned}$$

où I est un intervalle et $\alpha, \beta : I \xrightarrow{C^k} \mathbb{R}^3$.

- La famille des droites

$$v \longmapsto \alpha(u) + v\beta(u)$$

constitue un recouvrement de $S = f(I \times \mathbb{R})$.

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge





Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss





Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

Surfaces réglées




Surfaces réglées



Surfaces réglées

Proposition.— *L'hyperboloïde à une nappe et le parabololoïde hyperbolique sont des surfaces réglées.*





Surfaces réglées

Démonstration.— On commence par l'hyperboloïde à une nappe. Quitte à composer par une application affine on peut supposer que l'hyperboloïde H a pour équation implicite

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1.$$

En effet, une application affine envoie droites sur droites.

- L'intersection de H avec le plan $x = 1$ est la réunion de deux droites $D = \{x = 1, y = z\}$ et $D' = \{x = 1, y = -z\}$.



Surfaces réglées


- Puisque H est une surface de révolution, les familles

$$\mathcal{F} = \{R_{e_3, \theta}(D) \mid \theta \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}\}$$

et

$$\mathcal{F}' = \{R_{e_3, \theta}(D') \mid \theta \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}\}$$

forment respectivement une partition de H .



Surfaces réglées

- Pour le PH, quitte à composer par une application affine on peut toujours supposer qu'il admet pour équation implicite

$$x^2 - y^2 - z = 0.$$

- Soient $(P_a)_{a \in \mathbb{R}}$ et $(P'_a)_{a \in \mathbb{R}}$ les familles de plans définies respectivement par les équations



$$x - y = a \quad \text{et} \quad x + y = a.$$

Les intersections de P_a et de P'_a avec le PH sont les droites

$$D_a : \quad x - y = a \quad \text{et} \quad z = 2ay + a^2$$

$$D'_a : \quad x + y = a \quad \text{et} \quad z = -2ay + a^2$$

Surfaces réglées



- Il est alors facile de vérifier que les familles

$$\mathcal{F} = \{D_a \mid a \in \mathbb{R}\} \quad \text{et} \quad \mathcal{F}' = \{D'_a \mid a \in \mathbb{R}\}$$

forment chacune une partition du PH. □

Surfaces réglées




Un château d'eau

Surfaces réglées



Un quartier de Kobe (Japon)

Surfaces réglées



Un passage protégé entre deux immeubles à Manchester

Surfaces réglées



Où mène l'étude des courbes et surfaces...

Surfaces réglées



Une petite faim ?

Gaspard Monge (1746-1818)

Régularité

Surfaces
régliées

**Gaspard
Monge**

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède



Gaspard Monge (1746-1818)

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss


Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

- Savant illustre, fondateur de la *géométrie descriptive* et homme politique ordinaire, né à Beaune et mort à Paris. Il fut l'un des fondateurs de l'Ecole polytechnique où il devint aussi professeur.
- La géométrie descriptive est une méthode pour résoudre de façon graphique sur le papier des problèmes d'intersections et d'ombres entre volumes et surfaces définis de façon géométrique dans l'espace à trois dimensions.

Gaspard Monge (1746-1818)

- Régularité
- Surfaces réglées
- Gaspard Monge**
- Première forme fondamentale
- Carl Friedrich Gauss
- Aire d'une surface paramétrée
- Archimède



Un exemple : l'intersection d'un cône et d'une sphère.

Gaspard Monge (1746-1818)

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

- La Révolution française, qu'il soutient dès 1789, change complètement le cours de sa vie, il quitte l'Académie des sciences pour devenir ministre de la marine.
- Il pousse à l'instauration d'un système de poids et mesures fondé sur le système décimal. Il propose d'instaurer un calendrier avec des semaines de dix jours : le calendrier républicain qui ne durera pas au-delà de 1806.
- Sous Napoléon, Monge est nommé membre du Sénat à sa création. Il en devient président ensuite.

Gaspard Monge (1746-1818)

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

« Monge était le plus doux, le plus faible des hommes, et n'aurait pas laissé tuer un poulet s'il eut fallu en faire l'exécution lui-même, ou seulement devant lui. Ce forcené républicain, à ce qu'il croyait, avait pourtant un espèce de culte pour moi, c'était de l'adoration : il m'aimait comme on aime sa maîtresse »

Napoléon Bonaparte

Première forme fondamentale

- On suppose désormais que \mathbb{R}^3 est muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

- Soient $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{S} \subset \mathbb{R}^3$ une surface paramétrée régulière et

$$\begin{aligned}\gamma : I &\longrightarrow \mathcal{U} \\ t &\longmapsto (u(t), v(t))\end{aligned}$$

une courbe régulière. La courbe

$$\bar{\gamma} := f \circ \gamma : I \longrightarrow \mathcal{S}$$

est une courbe paramétrée dont le support est inclu dans \mathcal{S} .
On dit alors que la courbe est « tracée sur la surface ».

Première forme fondamentale

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

- La longueur de $\bar{\gamma}$ est

$$\begin{aligned} \text{Long}(\bar{\gamma}) &= \int_I \|(\bar{\gamma})'(t)\| dt \\ &= \int_I \left\langle \frac{\partial}{\partial t}(f \circ \gamma)(t), \frac{\partial}{\partial t}(f \circ \gamma)(t) \right\rangle^{\frac{1}{2}} dt \\ &= \int_I \left(Eu'(t)^2 + 2Fu'(t)v'(t) + Gv'(t)^2 \right)^{\frac{1}{2}} dt \end{aligned}$$

avec

$$E(u, v) = \left\| \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) \right\|^2 \quad G(u, v) = \left\| \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) \right\|^2$$

$$F(u, v) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial u}(u, v), \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) \right\rangle.$$

Première forme fondamentale

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède


- La longueur de γ est

$$\begin{aligned} \text{Long}(\gamma) &= \int_I \|\gamma'(t)\| dt \\ &= \int_I \left(u'(t)^2 + v'(t)^2 \right)^{\frac{1}{2}} dt \end{aligned}$$

Proposition.— *Le paramétrage $f : \mathcal{U} \rightarrow S$ préserve la longueur des courbes ssi*

$$\forall u, v \in \mathcal{U}, \quad E(u, v) = G(u, v) = 1 \quad \text{et} \quad F(u, v) = 0.$$

Première forme fondamentale




Exemple 1.– Soit

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\longmapsto (\cos(u), \sin(u), v) \end{aligned}$$

Un calcul immédiat montre que $E = G = 1$ et $F = 0$: la longueur des courbes est donc préservée.

Première forme fondamentale



Exemple 2.– Soit

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \times]0, \pi[&\longrightarrow \mathbb{S}^2 \setminus \{N, S\} \\ (u, v) &\longmapsto (\cos(u) \sin(v), \sin(u) \sin(v), \cos(v)) \end{aligned}$$

Un calcul immédiat montre que $E = \sin^2(v)$, $G = 1$ et $F = 0$: la longueur des courbes $u \mapsto f(u, v_0)$ n'est pas préservée sauf si $v_0 = \frac{\pi}{2}$.

Première forme fondamentale

- On suppose que $f : \mathcal{U} \rightarrow S$ est injective et régulière.

Définition.— Soit $p \in S$. On appelle PREMIÈRE FORME FONDAMENTALE et on note $I_p(\cdot, \cdot)$ la forme bilinéaire sur $T_p S$ qui est la restriction à $T_p S$ du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ de \mathbb{R}^3 .
Autrement dit :

$$\forall X, Y \in T_p S, \quad I_p(X, Y) := \langle X, Y \rangle.$$

- Supposons $p = f(u, v)$ et écrivons X et Y dans la base $(f_u(u, v), f_v(u, v))$ de $T_p S$:

$$X = X_u f_u + X_v f_v \quad \text{et} \quad Y = Y_u f_u + Y_v f_v.$$

Première forme fondamentale

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

- On a alors

$$\begin{aligned} I_p(X, Y) &= \langle X, Y \rangle \\ &= \langle X_u f_u + X_v f_v, Y_u f_u + Y_v f_v \rangle \\ &= X_u Y_u \langle f_u, f_u \rangle + X_v Y_v \langle f_v, f_v \rangle \\ &\quad + (X_u Y_v + X_v Y_u) \langle f_u, f_v \rangle \\ &= X_u Y_u E(u, v) + X_v Y_v G(u, v) \\ &\quad + (X_u Y_v + X_v Y_u) F(u, v) \end{aligned}$$

- La matrice de I_p dans la base (f_u, f_v) est donc

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

Première forme fondamentale

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

- En particulier

$$I_p(X, Y) = (X_u, X_v) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_u \\ Y_v \end{pmatrix}$$

Définition.— Les fonctions E , F et G sont appelées les COEFFICIENTS DE LA PREMIÈRE FORME FONDAMENTALE dans la base (f_u, f_v) .



Première forme fondamentale

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède


Exemple 1 (suite).– Dans la base

$$f_u = (-\sin(u), \cos(u), 0), \quad f_v = (0, 0, 1)$$

la matrice de la première forme fondamentale du cylindre est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Elle est indépendante du point $p = f(u, v)$ choisi.



Première forme fondamentale

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

Exemple 2 (suite).– Dans la base

$$f_u = (-\sin(u) \sin(v), \cos(u) \sin(v), 0)$$

$$f_v = (\cos(u) \cos(v), \sin(u) \cos(v), -\sin(v))$$

la matrice de la première forme fondamentale de la sphère privée du pôle nord et du pôle sud est

$$\begin{pmatrix} \sin^2(v) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Elle ne dépend que de v .

Première forme fondamentale

Définition.— Deux surfaces paramétrées régulières et injectives

$$f_i : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{S}_i$$

$i = 1$ ou 2 , sont dites ISOMÉTRIQUES si les coefficients de la première forme fondamentale de f_1 calculés dans la base $((f_1)_u, (f_1)_v)$ sont égaux à ceux de f_2 calculés dans la base $((f_2)_u, (f_2)_v)$, autrement dit, si

$$\left\| \frac{\partial f_1}{\partial u}(u, v) \right\|^2 = \left\| \frac{\partial f_2}{\partial u}(u, v) \right\|^2 \quad \left\| \frac{\partial f_1}{\partial v}(u, v) \right\|^2 = \left\| \frac{\partial f_2}{\partial v}(u, v) \right\|^2$$

$$\left\langle \frac{\partial f_1}{\partial u}(u, v), \frac{\partial f_1}{\partial v}(u, v) \right\rangle = \left\langle \frac{\partial f_2}{\partial u}(u, v), \frac{\partial f_2}{\partial v}(u, v) \right\rangle$$

Première forme fondamentale

- En particulier, si f_1 et f_2 sont isométriques alors pour toute courbe régulière

$$\gamma : I \longrightarrow \mathcal{U}$$

on a

$$Long(f_1 \circ \gamma) = Long(f_2 \circ \gamma).$$

Exemple 3.– Soient

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f_1} & \mathbb{R}^3 \\ (u, v) & \longmapsto & (\cos(u), \sin(u), v) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f_2} & \mathbb{R}^3 \\ (u, v) & \longmapsto & (u, v, 0) \end{array}$$

D'après les calculs faits à l'exemple 1, les surfaces paramétrées f_1 et f_2 sont isométriques.

Première forme fondamentale

Régularité

Surfaces
régliées


Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède



Exemple 4.– Soit

$$\begin{aligned} f_1 :]0, 2\pi[\times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathcal{H} \\ (u, v) &\longmapsto (sh(v) \cos(u), sh(v) \sin(u), u) \end{aligned}$$

Première forme fondamentale

Régularité

Surfaces
réglées


Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède



Et soit

$$\begin{aligned} f_2 :]0, 2\pi[\times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathcal{C} \\ (u, v) &\longmapsto (-ch(v) \sin(u), ch(v) \cos(u), v) \end{aligned}$$

Première forme fondamentale


- On a

$$\left\| \frac{\partial f_1}{\partial u}(u, v) \right\|^2 = \left\| \frac{\partial f_2}{\partial u}(u, v) \right\|^2 = ch^2 v$$


$$\left\| \frac{\partial f_1}{\partial v}(u, v) \right\|^2 = \left\| \frac{\partial f_2}{\partial v}(u, v) \right\|^2 = ch^2 v$$

$$\left\langle \frac{\partial f_1}{\partial u}(u, v), \frac{\partial f_1}{\partial v}(u, v) \right\rangle = \left\langle \frac{\partial f_2}{\partial u}(u, v), \frac{\partial f_2}{\partial v}(u, v) \right\rangle = 0$$


donc f_1 et f_2 sont isométriques.



Première forme fondamentale



Première forme fondamentale



Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge


**Première
forme
fondamentale**

Carl Friedrich
Gauss


Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède


Première forme fondamentale



Première forme fondamentale



Première forme fondamentale



Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge


**Première
forme
fondamentale**

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

Première forme fondamentale



Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

**Carl Friedrich
Gauss**

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

Carl Friedrich Gauss (1777-1855)



Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

- L'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, un véritable génie.
- Gauss n'ayant publié qu'une partie infime de ses découvertes, la postérité découvre la profondeur et l'étendue de son œuvre uniquement lorsque son journal intime, publié en 1898, est découvert et exploité.
- Distant et austère, il détestait enseigner et ne travailla jamais comme professeur de mathématiques.
- Gauss était profondément pieux et conservateur. Il soutint la monarchie et s'opposa à Napoléon qu'il vit comme un semeur de révolution.

Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

- Il apporta des contributions majeures en théorie des nombres, en statistiques, en analyse, en géométrie différentielle, en géophysique, en électrostatique, en astronomie et en optique.
- Concernant cette séance, c'est lui le premier qui a compris l'importance de la première forme fondamentale : elle détermine complètement la géométrie intrinsèque de la surface.
- A ce sujet il découvre un théorème merveilleux, le célèbre *Theorema egregium* que nous verrons dans la leçon intitulée *Courbure*.

Carl Friedrich Gauss (1777-1855)



- Une histoire apocryphe : prévenu au milieu d'un problème que sa femme était en train de mourir Gauss aurait répondu : « Dites lui d'attendre un moment que j'aie fini. »

Aire d'une surface paramétrée

Définition.— Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow S$ une surface paramétrée régulière. On appelle AIRE DE f le nombre

$$\text{Aire}(f) := \int_{\mathcal{U}} \|f_u \wedge f_v\| \, dudv.$$

- Rappelons que $\|X \wedge Y\|$ est l'aire du parallélogramme formé par X et Y .
- L'identité de Lagrange

$$\|X\|^2 \|Y\|^2 = \|X \wedge Y\|^2 + \langle X, Y \rangle^2$$

donne ici

$$\begin{aligned} \|X \wedge Y\|^2 &= \|X\|^2 \|Y\|^2 - \langle X, Y \rangle^2 \\ &= EG - F^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Aire d'une surface paramétrée

- Ainsi

$$\text{Aire}(f) := \int_{\mathcal{U}} \sqrt{EG - F^2} \, dudv.$$

- Notons que

$$EG - F^2 = 0 \iff \|f_u \wedge f_v\| = 0.$$

Par conséquent :

Lemme.— Une surface paramétrée $f : \mathcal{U} \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3$ est régulière en $p \in \mathcal{U}$ ssi

$$(EG - F^2)(p) \neq 0.$$

Aire d'une surface paramétrée

Proposition.— Soit $\varphi : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{U}$ un C^1 -difféomorphisme et $g = f \circ \varphi$ une reparamétrisation alors

$$\text{Aire}(g) = \text{Aire}(f).$$

Démonstration.— On écrit

$$dg_{(u',v')} = df_{\varphi(u',v')} \circ d\varphi_{(u',v')}$$

sous forme matricielle :

$$(g_{u'}, g_{v'})_{(u', v')} = (f_u, f_v)_{\varphi(u', v')} \begin{pmatrix} (\varphi_1)_{u'} & (\varphi_1)_{v'} \\ (\varphi_2)_{u'} & (\varphi_2)_{v'} \end{pmatrix}_{(u', v')}$$

où bien sûr $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$.

Aire d'une surface paramétrée

- Ainsi

$$g_{u'}(u', v') = (\varphi_1)_{u'}(u', v') \cdot f_{u \circ \varphi}(u', v') + (\varphi_2)_{u'}(u', v') \cdot f_{v \circ \varphi}(u', v')$$

$$g_{v'}(u', v') = (\varphi_1)_{v'}(u', v') \cdot f_{u \circ \varphi}(u', v') + (\varphi_2)_{v'}(u', v') \cdot f_{v \circ \varphi}(u', v')$$

- Puis

$$\begin{aligned} g_{u'} \wedge g_{v'} &= ((\varphi_1)_{u'}(\varphi_2)_{v'} - (\varphi_1)_{v'}(\varphi_2)_{u'}) (f_u \wedge f_v) \circ \varphi \\ &= (\det d\varphi_{(u', v')}) \cdot (f_u \wedge f_v) \circ \varphi \end{aligned}$$

- Par conséquent

$$\begin{aligned} \text{Aire}(g) &= \int_{\mathcal{V}} \|g_{u'} \wedge g_{v'}\| du' dv' \\ &= \int_{\mathcal{V}} |\det d\varphi_{(u', v')}| \cdot \|(f_u \wedge f_v) \circ \varphi\| du' dv' \end{aligned}$$

Aire d'une surface paramétrée

- La formule du changement de variables dans les intégrales permet de conclure

$$\begin{aligned} \text{Aire}(g) &= \int_U \|f_u \wedge f_v\| \, dudv \\ &= \text{Aire}(f) \quad \square \end{aligned}$$

Exemple.– Aire d'un cylindre. Soit

$$\begin{aligned} f :]0, 2\pi[\times]0, 1[&\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\longmapsto (\cos(u), \sin(u), v) \end{aligned}$$

On a $E = G = 1$ et $F = 0$, donc

$$\text{Aire}(f) = \int_{]0, 2\pi[\times]0, 1[} \sqrt{EG - F^2} \, dudv = 2\pi.$$

Mais $f(]0, 2\pi[\times]0, 1[)$ n'est pas tout à fait un cylindre...

Aire d'une surface paramétrée

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

- Bien sûr, on peut étendre la définition de l'aire au cas où $f : \bar{\mathcal{U}} \rightarrow \mathcal{S}$.

Lemme évident.– Si $\bar{\mathcal{U}} \setminus \mathcal{U}$ est de mesure nulle alors

$$\text{Aire}(f) = \text{Aire}(f|_{\mathcal{U}})$$

que f soit régulière ou non sur $\bar{\mathcal{U}} \setminus \mathcal{U}$.

- Dans l'exemple précédent, il est donc indifférent de travailler avec $\mathcal{U} =]0, 2\pi[\times]0, 1[$ ou $\bar{\mathcal{U}} = [0, 2\pi] \times [0, 1]$.

Aire d'une surface paramétrée

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède


- Attention, contrairement à ce que l'intuition pourrait laisser penser il existe des ouverts \mathcal{U} avec $\bar{\mathcal{U}} \setminus \mathcal{U}$ de mesure non nulle.
- Un exemple en dimension un : prendre $\mathcal{U} =$ le complémentaire dans $[0, 1]$ de l'ensemble SVC de Smith–Volterra–Cantor.



Ce complémentaire est ouvert car réunion de tous les ouverts que l'on a ôtés lors de la construction du SVC. On montre que $\bar{\mathcal{U}} = [0, 1]$ et que la mesure de Lebesgue de $SVC = \bar{\mathcal{U}} \setminus \mathcal{U}$ vaut $\frac{1}{2}$.

Aire d'une surface paramétrée

- En général, déterminer la mesure de $\overline{U} \setminus U$ est un problème difficile.
- Voici une question ouverte : *le bord de l'ensemble de Mandelbrot est-il de mesure nulle ?*



On sait depuis 1998 que la dimension de Hausdorff du bord vaut

2

Aire d'une surface paramétrée

Application : l'aire de la sphère.— On considère

$$\begin{aligned} f : [0, 2\pi] \times [0, \pi] &\longrightarrow \mathbb{S}^2 \\ (u, v) &\longmapsto (\cos(u) \sin(v), \sin(u) \sin(v), \cos(v)). \end{aligned}$$

Restreinte à $\mathcal{U} =]0, 2\pi[\times]0, \pi[$, cette paramétrisation est injective et régulière et on a déjà calculé :

$$E = \sin^2(v), \quad F = 0, \quad G = 1.$$

- On a donc

$$\begin{aligned} \text{Aire}(f) &= \int_{[0, 2\pi] \times [0, \pi]} \sqrt{EG - F^2} \, dudv \\ &= 2\pi \int_0^\pi \sin(v) \, dv \\ &= 4\pi. \end{aligned}$$

Aire d'une surface paramétrée

- En se permettant un léger abus de notation consistant à confondre f et son support, on écrit

$$\text{Aire}(\mathbb{S}^2) = 4\pi.$$

- Attention toutefois, en général $\text{Aire}(f)$ n'est pas l'aire du support au sens intuitif. Par exemple

$$\begin{aligned} g : [0, 4\pi] \times [0, \pi] &\longrightarrow \mathbb{S}^2 \\ (u, v) &\longmapsto (\cos(u) \sin(v), \sin(u) \sin(v), \cos(v)). \end{aligned}$$

a pour support \mathbb{S}^2 mais

$$\text{Aire}(g) = 8\pi.$$

Aire d'une surface paramétrée

Définition.– Soit f une surface paramétrée. La fonction $\sqrt{EG - F^2}$ est appelée l'ÉLÉMENT D'AIRES de f .

- On note également d^2S pour $\sqrt{EG - F^2}dudv$. Ainsi

$$\text{Aire}(f) := \int_{\mathcal{U}} d^2S$$

- Supposons f injective et soit $\bar{h} : S \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Définition.– On appelle INTÉGRALE DE \bar{h} SUR $S = f(\mathcal{U})$ le nombre

$$\int_S \bar{h} d^2S := \int_{\mathcal{U}} h(u, v) \sqrt{EG - F^2} dudv$$

où $h := \bar{h} \circ f$.

- On vérifie comme pour l'aire que ce nombre est invariant par reparamétrage.

Définition.— Deux surfaces paramétrées régulières et injectives

$$f_i : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{S}_i$$


$i = 1$ ou 2 , sont dites SYMPLECTOMORPHES si elles ont même élément d'aire.

- Dans ce cas, pour tout borélien $A \subset \mathcal{U}$, on a :

$$\text{Aire}(f_{1|A}) = \text{Aire}(f_{2|A}).$$

Aire d'une surface paramétrée

Un exemple : Le théorème d'Archimède. – *La projection radiale de la sphère sur son cylindre circonscrit préserve les aires. En particulier l'aire de la sphère est égale à celle du cylindre circonscrit.*



La projection radiale est l'application

$$\begin{aligned} \text{proj} : \mathbb{S}^2 \setminus \{N, S\} &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \times]-1, 1[\\ (x, y, z) &\longmapsto \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z \right). \end{aligned}$$

Aire d'une surface paramétrée

- Soit

$$\begin{aligned} f : [0, 2\pi] \times]0, \pi[&\longrightarrow \mathbb{S}^2 \setminus \{N, S\} \\ (u, v) &\longmapsto (\cos(u) \sin(v), \sin(u) \sin(v), \cos(v)). \end{aligned}$$

la paramétrisation usuelle de $\mathbb{S}^2 \setminus \{N, S\}$.

- Soit $g = \text{proj} \circ f$:

$$\begin{aligned} g : [0, 2\pi] \times]0, \pi[&\longrightarrow \mathbb{S}^1 \times]-1, 1[\\ (u, v) &\longmapsto (\cos(u), \sin(u), \cos(v)). \end{aligned}$$

- Dans le langage de la théorie des surfaces paramétrées le théorème d'Archimède s'énonce ainsi :

Théorème.– *Les paramétrisations f et g sont symplectomorphes.*

Aire d'une surface paramétrée

Démonstration.— La matrice de la première forme fondamentale de f dans la base (f_u, f_v) est

$$\begin{pmatrix} \sin^2(v) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et par conséquent $\sqrt{EG - F^2} = \sin(v)$.

- La matrice de la première forme fondamentale de g dans la base (g_u, g_v) est


$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2(v) \end{pmatrix}$$

et par conséquent $\sqrt{EG - F^2} = \sin(v)$. □

- Notons que f et g ne sont pas isométriques.




Aire d'une surface paramétrée



La projection radiale : une carte qui ne ment pas sur les aires

Archimède (-287/-212)



Archimède par Domenico Fetti (1620)

Archimède (-287/-212)

Régularité

Surfaces
régliées

Gaspard
Monge

Première
forme
fondamentale

Carl Friedrich
Gauss

Aire d'une
surface
paramétrée

Archimède

- Considéré comme le plus grand mathématicien de l'Antiquité et l'un des plus grands de tous les temps.
- Calcule l'aire sous un arc de parabole, donne un encadrement de π d'une remarquable précision, établit des formules pour les volumes des surfaces de révolution.
- Egalement physicien (poussée d'Archimède) et ingénieur (vis d'Archimède).
- Il vivait à Syracuse, en Sicile, alors dans la Grande Grèce.

Archimède (-287/-212)



La mort d'Archimède par Thomas DeGeorge

Archimède (-287/-212)



*Jean-Etienne Montucla,
né à Lyon en 1725.*

*« Archimède avait désiré que l'on gravât [sur son tombeau]
une sphère inscrite dans un cylindre en mémoire de sa
découverte sur le rapport de ces corps.*

*Cela fut exécuté, et c'est à ce signe que Cicéron, étant
questeur en Sicile, retrouva ce monument au milieu des
ronces et des épines qui le dérobaient à la vue »*